| 療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 1ｸｰﾙ |
|---|---|---|---|
| ＣＢＤＣＡ＋ PTX | パクリタキセル | ２００mg/㎡ | ２１日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝６ | |
| ＣＢＤＣＡ＋ＰＥＭ | アリムタ | ５００mg/㎡ | ２１日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝６ | |
| ＣＤＤＰ＋ＰＥＭ | アリムタ | ５００mg/㎡ | ２１日 |
| （悪性胸膜中皮腫も使用可） | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| ＰＥＭ | アリムタ | ５００mg/㎡ | ２１日 |
| ＧＥＭ＋ＶＮＲ(Biweekly) | ゲムシタビン | １０００mg/㎡ | １４日 |
| | ロゼウス | ２５mg/㎡ | |
| ＧＥＭ | ゲムシタビン | １０００mg/㎡ | ２８日 |
| ＶＮＲ | ロゼウス | ２５mg/㎡ | ２８日 |
| CBDCA+GEM | ゲムシタビン | １０００mg/㎡ | 21日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝5 | |
| DOC | ドセタキセル | ６０mg/㎡ | ２１日 |
| ＣＢＤＣＡ＋Ｓ－１ | S-1 | 体表面積に準じて | ２１日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝６ | |
| ＣＤＤＰ＋ＶＮＲ | ロゼウス | ２５mg/㎡ | ２１日 |
| | シスプラチン | ８０mg/㎡ | |
| ＣＢＤＣＡ＋ＶＮＲ | ロゼウス | ２５mg/㎡ | ２１日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝６ | |
| Bev | アバスチン | １５mg/kg | ２１日 |
| ＣＤＤＰ＋ＧＥＭ | ゲムシタビン | １０００mg/㎡ | ２１日 |
| | シスプラチン | ８０mg/㎡ | |
| ＡＭＲ | カルセド | ４０ｍｇ/㎡ | １４日 |
| nab-PTX | アブラキサン | １００mg/㎡ | ２１日 |
| ＣＢＤＣＡ+nab-PTX | アブラキサン | １００mg/㎡ | ２１日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝６ | |
| ニボルマブ(オプジーボ)(２W) | オプジーボ | ２４０mg/body | １４日 |
| ニボルマブ(オプジーボ)(４W) | オプジーボ | ４８０mg/body | ２８日 |
| ＤＯＣ＋ＲＡＭ | サイラムザ | １０mg/kg | ２１日 |
| | ドセタキセル | ６０mg/㎡ | |
| ペムブロリズマブ(キイトルーダ)(３W) | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| ペムブロリズマブ(キイトルーダ)(６W) | キイトルーダ | ４００mg/body | ４２日 |
| ＣＤＤＰ＋Ｓ－１(Day1) | シスプラチン | ６０mg/㎡ | ２８日 |
| | S-1 | 体表面積に準じて | |
| アテゾリズマブ(テセントリク) | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CBDCA+PTX(放射線,Weekly) | パクリタキセル | ４０mg/㎡ | ７０日 |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝2 | |
| デュルマブ(イミフィンジ)(1500mg/body) | イミフィンジ | 1500mg/body | ２８日 |
| ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ（ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ）+ＣＢＤＣＡ+nab-ＰTX | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | アブラキサン | １００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ（ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ）+ＣＢＤＣＡ＋ＰＥＭ | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝5 | |
| ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ﾃｾﾝﾄﾘｸ)+Bev+ＣＢＤＣＡ＋ＰＴＸ | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| | アバスチン | １５mg/kg | |
| | パクリタキセル | 175mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ（ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ）+ＣＢＤＣＡ＋ＰＴＸ | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | パクリタキセル | ２００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ（ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ）+ＣＤＤＰ＋ＰＥＭ | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ﾃｾﾝﾄﾘｸ)+ＣＤＤＰ＋ＰＥＭ | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ﾃｾﾝﾄﾘｸ)+ＣＢＤＣＡ＋ＰＥＭ | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝5 | |
| ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ﾃｾﾝﾄﾘｸ)+ＣＢＤＣＡ+nab-PTX | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| | アブラキサン | １００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ﾃｾﾝﾄﾘｸ)+Bev(維持) | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| | アバスチン | １５mg/kg | |
| ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ（ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ）+ＰＥＭ(維持) | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ﾃｾﾝﾄﾘｸ)+PEM(維持) | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ | オプジーボ | ３６０mg/body | ４２日 |
| | ヤーボイ | 1mg/kg | |
| RAM+エルロチニブ | サイラムザ | １０mg/kg | １４日 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | タルセバ | １５０mg/日 | |
| RAM+ゲフィチニブ | サイラムザ | １０mg/kg | １４日 |
| | イレッサ | ２５０mg/日 | |
| CBDCA+PEM＋ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ(導入) | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | ４２日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | オプジーボ | ３６０mg/body | |
| | ヤーボイ | 1mg/kg | |
| CBDCA+PEM＋ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ(維持) | オプジーボ | ３６０mg/body | ４２日 |
| | ヤーボイ | 1mg/kg | |
| CBDCA+PTX＋ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ(導入) | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | ４２日 |
| | パクリタキセル | ２００mg/㎡ | |
| | オプジーボ | ３６０mg/body | |
| | ヤーボイ | 1mg/kg | |
| CBDCA+PTX＋ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ(維持) | オプジーボ | ３６０mg/body | ４２日 |
| | ヤーボイ | 1mg/kg | |
| アテゾリズマブ(テセントリク)(術後) | テセントリク | １２００mg/body | ２１日 |
| ポートラーザ＋GC | ポートラーザ | ８００mg/body | ２１日 |
| | ゲムシタビン | １２５０mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| CBDCA+放射線療法 | カルボプラチン | ３０mg/㎡ | 7日 |
| イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA+nab-P(併用療法期) | イミフィンジ | １５００mg/body | ２１日 |
| | イジュド | ７５mg/body | |
| | アブラキサン | 100mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA+PEM療法(併用療法期) | イミフィンジ | １５００mg/body | ２１日 |
| | イジュド | ７５mg/body | |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| イミフィンジ＋イジュド＋ＣＤＤＰ＋ＰＥＭ(併用療法期) | イミフィンジ | １５００mg/body | ２１日 |
| | イジュド | ７５mg/body | |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA+GEM療法(併用療法期) | イミフィンジ | １５００mg/body | ２１日 |
| | イジュド | ７５mg/body | |
| | ゲムシタビン | １２５０mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| イミフィンジ＋イジュド＋CDDP+GEM療法(併用療法期) | イミフィンジ | １５００mg/body | ２１日 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | イジュド | ７５mg/body | |
| | ゲムシタビン | １２５０mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| イミフィンジ＋イジュド療法(維持療法期1ｺｰｽ目) | イミフィンジ | １５００mg/body | ５６日 |
| | イジュド | ７５mg/body | |
| イミフィンジ＋イジュド療法(維持療法期2ｺｰｽ目以降) | イミフィンジ | １５００mg/body | ２８日 |
| ニボルマブ(オプジーボ)＋CBDCA＋PTX療法(術前) | オプジーボ | ３６０mg/body | ２１日 |
| | パクリタキセル | ２００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| ニボルマブ(オプジーボ)＋CDDP+GEM療法(術前) | オプジーボ | ３６０mg/body | ２１日 |
| | ゲムシタビン | １２５０mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| ニボルマブ(オプジーボ)＋CBDCA+GEM療法(術前) | オプジーボ | ３６０mg/body | ２１日 |
| | ゲムシタビン | １２５０mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| ニボルマブ(オプジーボ)＋CDDP+PEM療法(術前) | オプジーボ | ３６０mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| ニボルマブ(オプジーボ)＋CBDCA+PEM療法(術前) | オプジーボ | ３６０mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | カルボプラチン | ＡＵＣ＝6 | |
| (術前)キイトルーダ+GＣ併用療法 | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | ゲムシタビン | １０００mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| (術前)キイトルーダ+CDDP+PEM療法 | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |
| | アリムタ | ５００mg/㎡ | |
| | シスプラチン | ７５mg/㎡ | |
| (３W)(術後)キイトルーダ単剤療法 | キイトルーダ | ２００mg/body | ２１日 |