

| 療法名                                 | 薬剤名      | 投与量                       | 1クール        |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| GEM                                 | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> | 2 8 日       |
| GEM+S-1療法                           | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> | 2 1 日/2 8 日 |
|                                     | S-1      | 体表面積に準じて                  |             |
| GC療法                                | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> | 2 1 日       |
|                                     | シスプラチン   | 2 5 mg/m <sup>2</sup>     |             |
| mFOLFIRINOX                         | オキサリプラチン | 8 5 mg/m <sup>2</sup>     | 1 4 日       |
|                                     | イリノテカン   | 1 5 0 mg/m <sup>2</sup>   |             |
|                                     | レボホリナート  | 2 0 0 mg/m <sup>2</sup>   |             |
|                                     | フルオロウラシル | 2 4 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
| nab-P+GEM療法                         | アブラキサン   | 1 2 5 mg/m <sup>2</sup>   | 2 8 日       |
|                                     | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
| STZ daily(5日間投与) ザノ<br>サー(ストレプトゾシン) | ザノサー     | 5 0 0 mg/m <sup>2</sup>   | 4 2 日       |
| オニバイド+5FU/LV療法                      | オニバイド    | 7 0 mg/m <sup>2</sup>     | 1 4 日       |
|                                     | レボホリナート  | 2 0 0 mg/m <sup>2</sup>   |             |
|                                     | フルオロウラシル | 2 4 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
| GC+イミフィンジ療法(導入)                     | イミフィンジ   | 1 5 0 0 mg/body           | 2 1 日       |
|                                     | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
|                                     | シスプラチン   | 2 5 mg/m <sup>2</sup>     |             |
| GC+イミフィンジ療法(維持)                     | イミフィンジ   | 1 5 0 0 mg/body           | 2 8 日       |
| GC5療法                               | S-1      | 体表面積に準じて                  | 1 4 日       |
|                                     | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
|                                     | シスプラチン   | 2 5 mg/m <sup>2</sup>     |             |
| GC+キイトルーダ併用療法(導<br>入)               | キイトルーダ   | 2 0 0 mg/body             | 2 1 日       |
|                                     | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
|                                     | シスプラチン   | 2 5 mg/m <sup>2</sup>     |             |
| GC+キイトルーダ併用療法(維<br>持)               | キイトルーダ   | 2 0 0 mg/body             | 2 1 日       |
|                                     | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> |             |
| (35サイクル以降) GC+キイト<br>ルーダ併用療法(GEM維持) | ゲムシタピン   | 1 0 0 0 mg/m <sup>2</sup> | 2 1 日       |