療法名	薬剤名	投与量	1ｸｰﾙ
トーリセル療法	トーリセル	２５mg/body	７日
(2W)ニボルマブ療法	オプジーボ	２４０mg/body	１４日
(４W)ニボルマブ療法	オプジーボ	４８０mg/body	２８日
(３W)ペムブロリズマブ＋アキシチニブ療法	キートルーダ	２００mg/body	２１日
	インライタ	１０ｍｇ/日	
(６W)ペムブロリズマブ＋アキシチニブ療法	キートルーダ	４００mg/body	４２日
	インライタ	１０ｍｇ/日	
バベンチオ＋インライタ療法	バベンチオ	１０mg/kg	１４日
	インライタ	１０mg/日	
(2W)ニボルマブ＋カボメティクス療法	オプジーボ	２４０mg/body	１４日
	カボメティクス	４０ｍｇ/日	
(4W)ニボルマブ＋カボメティクス療法	オプジーボ	４８０mg/body	２８日
	カボメティクス	４０ｍｇ/日	
ニボルマブ＋イピリムマブ療法（導入）	オプジーボ	２４０mg/body	４２日
	ヤーボイ	１ｍｇ/ｋｇ	
ニボルマブ＋イピリムマブ療法（維持）	オプジーボ	２４０mg/body	１４日
(３W)ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ)療法	キートルーダ	２００mg/body	２１日
(６W)ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ(ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ)療法	キートルーダ	４００mg/body	４２日
(３W)キイトルーダ+レンビマ併用療法	キートルーダ	２００mg/body	２１日
	レンビマ	２０mg/日	
(６W)キイトルーダ+レンビマ併用療法	キートルーダ	４００mg/body	４２日
	レンビマ	２０mg/日	